



Animales de Chile

Huemul

Hippocamelus Bisulcus

Orden: Artiodactyla / Familia: Cervidae / Conservación: PELIGRO DE EXTINCIÓN

Descripción: Su pelaje es de color café oscuro, mezclado con amarillo que es mudado dos veces al año: en otoño y en primavera. Su colorido le permite mimetizarse fácilmente con las rocas, suelo, matorrales y troncos; además le permite nadar con facilidad en las frías aguas, también lo protege del riguroso clima invernal.


Distribución geográfica: Ñuble (VIII región), Chiloé continental (X región), Aysén (XI región) y Magallanes (XII región), desde aproximadamente 450 msnm. hasta 1.300 msnm. Antiguamente esta especie llegaba hasta Cachapoal (VII región).

Hábitat: Bosques y zonas escarpadas.

Dieta: Determinada por la disponibilidad de alimento a través del año varía entre hierbas y arbustos (del estrato herbáceo, alstroemerias, geranios, orquídeas, violetas del monte y valeriana; entre los arbustos, el maitén es su preferido).

Conducta: Se han detectado individuos solitarios o formando parte de grupos pequeños de no más de dos o tres ejemplares, cuya composición es variable; ya sea por una hembra y un macho adulto, acompañados en algunas oportunidades por un cervatillo del año o preadulto, o solo por hembras.

Otros: El huemul es uno de los pocos animales que puede sufrir de "stress". Ante un riesgo inminente se queda quieto, asustado y podría llegar a morir. Sus principales amenazas son la caza, el ataque y contagio de enfermedades por parte de perros, la destrucción del hábitat, la competencia por el alimento y el contagio de enfermedades por parte del ganado.



Condor

Vultur Gryphus

Orden: Cathartiformes / Familia: Cathartidae / Conservación: VULNERABLE

Descripción: Tiene una envergadura de alas que alcanza los 3,5 metros; los machos, más pesados que las hembras, pesan unos 11,5 kg. Alcanza a medir casi 1 metro. Su plumaje es negro, con una gran zona blanca en las alas. Tiene una cabeza desnuda de un color rojo pálido y los machos poseen en la frente una cresta prominente. Su calvicie, es un rasgo característico y de utilidad, pues la ausencia de plumaje en esta zona, evita que este se impregne de sangre cuando mete la cabeza hurgando en los cuerpos de los animales al alimentarse.

Distribución geográfica: Todo Chile. (También se encuentra en Argentina, Bolivia, Brasil [occidental], Colombia, Ecuador, Paraguay [occidental], Perú y Venezuela).

Hábitat: A lo largo de la cordillera de los Andes; llegando a las costas en la zona norte y en el extremo sur del país.

Dieta: Carne descompuesta (carroña), a falta de ella, a veces debe alimentarse por animales moribundos, recién nacidos o huevos de otras aves.

Conducta: Suele planear solo o en pequeños grupos, son gregarios en sus dormitorios habituales y en torno a la comida.

Otros: Las amenazas a la población incluyen la pérdida de hábitat necesario para la búsqueda de alimento, el envenenamiento secundario de los animales muertos por los cazadores y la persecución de parte del hombre por la errónea creencia de los lugareños sobre su supuesta actividad depredadora sobre el ganado. Los Cóndores no son aves capaces de cazar, pues sus patas no les permiten agarrar, cargar pesos, ni matar presas.



Zorro Culpeo

Lycalopex Culpaeus

Orden: Carnívora / Familia: Canidae / Conservación: VULNERABLE

Descripción: Es el mayor de los zorros presentes en Chile, con un largo de 100 cm. (cabeza a tronco), más una cola de 40 cm. Pesa entre 7 y 9 kg. Su pelaje rojizo en la cabeza y orejas, es pardo amarillento en el resto del cuerpo. Su hocico es puntiagudo y alargado, con mandíbula blanca. Las patas rojizas con pies claros.

Distribución geográfica: A lo largo de la Cordillera de los Andes, desde el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, y la mitad oeste de la Argentina, llegando por el sur hasta el Archipiélago de Tierra del Fuego.

Hábitat: Matorrales a bosques y estepas, desde el nivel del mar hasta los 4.500 m de altitud. Prefiere márgenes y límites de arroyos y comunidades arbustivas densas.

Dieta: Come desde liebres hasta roedores pequeños o lagartijas; es un controlador de plagas de roedores, como el ratón de cola larga, transmisor del virus Hanta.

Conducta: Son solitarios, aunque al llegar el verano aúllan para encontrar pareja; una vez que se reproducen, buscan una guarida, se mantienen juntos durante la gestación que dura cerca de dos meses, luego que nacen los cachorros, ambos padres protegen esta guarida de intrusos, cuando sus crías cumplen dos meses de edad y son suficientemente fuertes para aprender a cazar, este grupo se separa.

Otros: La caza y el trapeo para obtener su piel fue la principal causa de mortalidad hasta comienzos de 1990. Han sido cazados y envenenados debido a conflictos con la crianza avícola y ganadería menor. Actualmente sus principales amenazas son la pérdida de hábitat, los atropellos, los ataques por parte de perros domésticos y asilvestrados y el contagio de enfermedades como la sarna y distemper, además de las heridas causadas por los "lazos" para cazar conejos.



Colaboran en la difusión:



Financia:



Ilustraciones: Italo Ahumada (<http://www.italoahumada.cl>) / Visítenos en www.jugueteriachilena.cl

Región de Valparaíso
Convocatoria 2017